

# RAZZA CAPRINA CILENTANA NERA



## ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Cilentana nera è presente soprattutto nelle aree geografiche interne della provincia di Salerno, per la maggior parte ricadenti nel territorio del Cilento, compreso nel "Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano". Risulta diffusa in particolare nelle zone di alta collina e di montagna e nelle aree con macchia mediterranea i cui pascoli sono di più difficile accesso e meno produttivi. Spesso si tratta di allevamenti misti, con ovini e caprini. Il sistema di allevamento è di tipo brado o semi brado anche se stanziale, con ampia utilizzazione del pascolo. I prodotti dell'allevamento sono costituiti dalla carne, con la produzione del capretto leggero e del latte, trasformato in genere a livello aziendale per la fabbricazione di cacio-ricotta, di formaggio di solo latte caprino o anche misto a latte ovino e di ricotta, sia da consumo fresco che secca.

## CARATTERI MORFOLOGICI

**Taglia:** media.

**Testa:** piccola; corna presenti nel 60% dei soggetti di entrambi i sessi, prevalentemente di tipo garganico rivolte all'indietro, con punta ad elica e diretta verso l'esterno, lunghe 30 –40 cm o anche di tipo alpino, come lama di sciabola curva all'indietro, lunghe 20-30 cm; presenza di barbetta nel 85% dei soggetti; il 52% dei soggetti risulta avere un portamento dell'orecchio semi pendente laterale e il 20% orizzontale.

**Collo:** robusto, ben unito alla spalla ed al garrese; presenza di tettole in entrambi i sessi 42% nei maschi, 52% nelle femmine.

**Tronco:** spalla ben legata al torace, il quale si presenta abbastanza profondo; dorso e lombi larghi, allungati e muscolosi; addome di media ampiezza; linea dorso-lombare tendente all'orizzontale; groppa mediamente sviluppata e tendenzialmente spiovente e/o inclinata verso gli ischi, abbastanza larga e lunga.

**Apparato mammario:** mammella prevalentemente di tipo bifida (60%), cui seguono il tipo ipoglobosa (21%), semibifida (13%) e globosa (5%).

**Arti:** robusti; articolazioni asciutte; unghia ampi, duri e resistenti, ben conformati e di colore nero.

**Mantello:** di colore nero uniforme, con presenza nei maschi di pelo solo lungo (90%), lungo e corto (8%), e nelle femmine di pelo solo lungo (67%) e lungo e corto (25%); sono tollerate limitate pezzature, in particolare nella regione ventrale, piccole balzane ma sempre accompagnate da unghioni neri.

**Pelle e pigmentazione:** pelle sottile e di colore nero; lingua, palato ed aperture naturali scure.

**Difetti tollerabili:** limitate pezzature, in particolare nella regione ventrale, piccole balzane purché accompagnate da unghioni neri.

**Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dalla riproduzione in L.G.:**

- Ernia ombelicale.
- Difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo.
- Criptorchidismo anche monolaterale.
- Ermafroditismo.
- Portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

## CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	12 mesi		36 mesi	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Lunghezza tronco (cm)	69	64	85	69
Altezza al garrese (cm)	70	65	76	68
Altezza alla croce (cm)	69	65	74	68
Larghezza groppa (cm)	17	15	18	16
Profondità torace (cm)	35	28	27	33
Circonferenza toracica (cm)	83	74	90	81

Le pecore sono caratterizzate da ciclo sessuale poliestrurale stagionale con elevata prolificità con tasso di gemellarità del 50%.

## ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Cilentana Nera è a duplice: latte e carne.

La gestione è finalizzata alla conservazione della variabilità genetica e ad esaltare per quanto possibile la produzione quanti-qualitativa di latte, senza trascurare il mantenimento delle caratteristiche di rusticità e prolificità dei soggetti per la produzione della carne.