

RAZZA CAPRINA OROBICA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Orobica o «Di Valgerola» è di origine sconosciuta. Viene allevata nelle Alpi Orobiche e nelle limitrofe aree prealpine, in provincia di Sondrio (Valgerola e limitrofe), Lecco (Valsassina, Val Varrone e Alto Lario orientale), Bergamo (alta Val Brembana). Il tipo di allevamento è semi estensivo che prevede il pascolo primaverile-autunnale e l'alpeggio estivo.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: media.

Testa: proporzionata, leggera, tendenzialmente fine; profilo fronto-nasale leggermente camuso o rettilineo; barba fluente nei maschi e spesso presente anche nelle femmine; orecchie non molto lunghe, erette, portate obliquamente in avanti, mai pendenti; corna molto lunghe anche nelle femmine, di sezione appiattita con lieve torsione elicoidale, incurvate lateralmente alla base e verso l'alto all'apice; abbastanza rari i soggetti acorni tollerati solo se femmine.

Collo: mediamente lungo e fine con presenza o meno di tette.

Tronco: torace e addome ben sviluppati; regione dorso lombare rettilinea e orizzontale; groppa larga e lievemente spiovente.

Apparato mammario: sviluppato; ben attaccato di forma globosa o piriforme; capezzoli tendenzialmente grossi, di forma conica, talvolta non distinti dalla mammella; sono tollerati, ma costituiscono difetto, i capezzoli accessori.

Arti: forti e corretti.

Mantello: molto vario, ma sempre caratterizzato da una notevole lunghezza del pelo sia sull'anteriore che sul posteriore che è tendenzialmente uniforme anche se i peli di lunghezza massima coprono la groppa e le cosce. Si riconoscono diverse varietà di mantello e sono le seguenti: *Farinet*: mantello di colore grigio, beige, beige con riflessi violacei, bianco crema; *Marin*: mantello pezzato tipico con prevalenza di nero o grigio nel posteriore e del bianco crema nell'anteriore, la testa è contraddistinta da due striature su entrambi i lati di colore nero o grigio; *Nigru*: nero focato; *Camosch*: mantello scuro con peli mescolati bianchi, neri e rossi nelle diverse tonalità, la testa è sempre più scura del fondo.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dalla riproduzione in L.G.:

- maschi acorni o con corna di forma atipica,
- femmine con corna a «cavaturacciolo» o «a sciabola» se portate all'indietro e parallele, pelo raso o lungo solo sul posteriore «bragadura»,
- mantello bianco candido con cute depigmentata,
- mantello «cintato» o con pezzature di colore bianco candido estese,
- «frisature» facciali (striature bianche dirette dalla regione sopraorbitale a quella boccale),
- mantello camosciato (riga mulina, estremità degli arti e tipica maschera facciale di colore nero su mantello di fondo fulvo o nocciola chiaro),
- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo,
- criptorchidismo anche monolaterale,
- ermafroditismo,
- portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	18 mesi		Adulti	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	79	70	79	73
Altezza alla groppa (cm)	79	72	81	74
Altezza toracica (cm)	31	27	36	33
Larghezza toracica (cm)	16	17	19	19
Larghezza anteriore groppa (cm)	18	18	20	22
Lunghezza tronco (cm)	76	73	92	79
Circonferenza toracica (cm)	80	78	93	89
Peso (kg)	61	45	80	65

La fertilità, intesa come rapporto percentuale fra capre partorite su capre alla monta, è intorno al 95%.

La prolificità, intesa come rapporto percentuale fra capretti nati su capre partorite, è intorno a 130%.

L'età media al primo parto è di 18 mesi.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Orobica è a duplice attitudine: latte e carne.

La carne è ottenuta con capretti di 10-15 kg.

La produzione del latte è di 300-400 litri per una lattazione che dura 160-190 giorni. Le produzioni medie di latte, senza poppate, sono di circa 220 litri nelle primipare e 330 nelle pluripare. La percentuale media di grasso è del 3% e il tenore medio delle proteine è del 2,9%