

RAZZA CAPRINA CILENTANA GRIGIA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Cilentana Grigia è presente soprattutto nelle aree geografiche interne della provincia di Salerno, per la maggior parte ricadenti nel territorio del Cilento, compreso nel «Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano». Risulta diffusa maggiormente nelle zone di bassa collina caratterizzate da pascoli più produttivi e più facilmente accessibili. La consistenza degli allevamenti è di pochi capi, sempre allevati insieme ad altri ecotipi di popolazione Cilentana, o ad altre razze o specie. Il sistema di allevamento è di tipo brado o semi brado anche se stanziale, con ampia utilizzazione del pascolo. I prodotti dell'allevamento sono costituiti prevalentemente dal latte ma anche dalla carne, con la produzione del capretto leggero. Il latte viene trasformato in genere a livello aziendale per la fabbricazione di cacio-ricotta, di formaggio di solo latte caprino o anche misto a latte ovino e di ricotta, sia da consumo fresco che stagionato.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: medio grande.

Testa: piccola, con corna presenti in circa la metà dei soggetti, in cui è più frequente il tipo alpino (17%) come lama di sciabola curva all'indietro, lunghe 20-30 cm e quello garganico (8%) rivolte all'indietro, con punta ad elica e diretta verso l'esterno, lunghe 30 – 40 cm; quasi tutti i maschi presentano la barbetta, le femmine per l'80%; il 42% dei soggetti risulta avere un portamento dell'orecchio semi pendente e il 35% semi pendente laterale.

Collo: lungo e leggero nelle femmine, più corto e robusto nei maschi; ben unito alla spalla e al garrese, con presenza di tette nel 60% dei soggetti.

Tronco: spalle forti e bene attaccate al torace; torace profondo e largo; dorso e lombi larghi, allungati e muscolosi; addome di media ampiezza; linea dorso-lombare tendente all'orizzontale; groppa mediamente sviluppata, tendenzialmente inclinata verso il posteriore e/o spiovente abbastanza larga e lunga.

Apparato mammario: mammella saldamente attaccata, prevalentemente di tipo bifido (53%), cui segue quella ipoglobosa (30%), semi-bifida (12%) e globosa (5%), con capezzoli di giusta dimensione, uniformi, rivolti verso l'anteriore.

Arti: in appiombio, forti ed asciutti con ossa piatte; unghie ampi e duri, larghi e resistenti, di colore grigio scuro o neri.

Mantello: di colore grigio uniforme generalmente con spalle, collo e dorso più scuro, prevalentemente a pelo lungo, solo lungo (93% nei maschi e 61% nelle femmine), o lungo e corto (28% nelle femmine).

Pelle e pigmentazione: pelle elastica e di colore grigio più o meno scuro; aperture naturali di colore grigio e nero.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dalla riproduzione in L.G.:

- mantello pezzato o con prevalenza di peli bianchi, associata ad assenza di corna
- ernia ombelicale.
- difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo.
- criptorchidismo anche monolaterale.
- ermafroditismo.
- portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	12 mesi		36 mesi	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Lunghezza tronco (cm)	62	54	71	71
Altezza al garrese (cm)	69	60	77	70
Altezza alla croce (cm)	70	64	73	70
Larghezza groppa (cm)	16	14	18	16
Profondità torace (cm)	33	30	38	36
Circonferenza toracica (cm)	83	70	88	87
Peso (kg)			65-70	45-50

Le capre sono caratterizzate da ciclo sessuale poliestrale stagionale con elevata prolificità (tasso di gemellarità al 50%).

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Cilentana Grigia è a prevalente attitudine latte, ma anche carne. La gestione di questa razza è finalizzata alla conservazione della variabilità genetica e ad esaltare per quanto possibile la produzione quanti-qualitativa di latte, senza trascurare il mantenimento delle caratteristiche di rusticità e prolificità dei soggetti per la produzione della carne.