

# RAZZA OVINA DELL'AMIATA



## ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Dell'Amiata fa parte di una popolazione ovina stanziale conosciuta come Pecora dell'Amiata è la discendente diretta della cosiddetta "Pecora Comune Toscana", "Nostrale" o "Vissana" ampiamente presente nella Toscana Centrale o meridionale nella prima metà del XIX secolo. Successivamente questa popolazione ovina, a seguito di meticciamenti con pecore merinizzate, si suddivise in due ecotipi: il primo, diffuso nella zona delle Crete Senesi e del versante settentrionale del Monte Amiata chiamata semplicemente pecora Senese, di taglia maggiore ma meno produttiva; il secondo tipo, chiamata pecora dell'Amiata o Amiatina, di taglia più ridotta, fortemente merinizzata e più produttiva in tutte e tre le attitudini, si diffuse sul Monte Amiata ed in particolare sul Monte Labbro. Successivi scambi di riproduttori tra i due ecotipi portarono a ricostituire intorno alla metà del secolo scorso una popolazione relativamente omogenea chiamata Pecora dell'Amiata. La razza è oggi diffusa nell'area meridionale della Toscana tra le province di Grosseto e Siena, in particolare nei comuni di Arcidosso, Roccalbegna e Castell'Azzara e nella zona delle Crete Senesi compresa nei comuni di Asciano, Buonconvento, Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso e Trequanda. La sua area di diffusione coincide con quella di origine.

## CARATTERI MORFOLOGICI

**Taglia:** media.

**Testa:** piccola, con profilo rettilineo o leggermente montonino. Orecchie relativamente corte e portate lateralmente. Presenza di corna nei maschi, rilevate nel 62% degli arieti, un 13% presenta solo abbozzi cornei ed il restante 25% è acorne. Le femmine per l'89% sono acorni, il 7% è dotata di abbozzi ed il rimanente 4% è provvisto di corna.

**Collo:** di media lunghezza, relativamente sottile, bene attaccato.

**Tronco:** relativamente lungo e ben proporzionato, rettilineo.

**Arti:** solidi e relativamente lunghi.

**Vello:** bianco, semichiuso con bioccoli conici.

**Pelle e pigmentazione:** elastica e leggermente rosea.

I difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G. sono: presenza di macchie scure della cute e del vello, ernia ombelicale, difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo), criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo. Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

## **CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI**

<b>Misure soggetti adulti</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
<b>Altezza al garrese (cm)</b>	73,8	70,6
<b>Altezza al sacro (cm)</b>	74	70,6
<b>Lunghezza tronco (cm)</b>	79	70,6
<b>Circonferenza toracica (cm)</b>	100,4	96,9
<b>Profondità del torace (cm)</b>	35,1	32,9

L'indirizzo riproduttivo è verso la conservazione della variabilità genetica della razza pura, molto rustica e prolifica e allevata per la produzione della carne.

## **ORIENTAMENTO PRODUTTIVO**

La razza Dell'Amiata è una razza ad attitudine carne.

La produzione di latte media è di 75-90 kg con una resa in formaggio del 20% circa (legata alla trasformazione del cacio fiore e/o pecorino stagionato).

La produzione media di lana in sucido è di 2,4 kg negli arieti e di 1,2 kg nelle pecore.