

# **RAZZA OVINA MERINIZZATA ITALIANA**



## ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Merinizzata Italiana è una popolazione ovina meticcica, nata da diversi incroci tra le razze merinizzate italiane (Gentile di Puglia e Sopravissana) e i tipi genetici Merino - derivati europei. Attualmente la merinizzata italiana viene allevata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Questa si adatta bene a diverse zone orografiche e sistemi di allevamento.

## CARATTERI MORFOLOGICI

**Taglia:** medio grande.

**Testa:** maschi: a profilo leggermente montonino, acorne; femmine: ben proporzionata, a profilo rettilineo, acorne.

**Collo:** maschi: corto e robusto con assenza di pliche; femmine: tendenzialmente corto o di media lunghezza.

**Tronco:** maschi: lungo, largo e tendenzialmente cilindrico, petto largo e ben disceso, linea dorso-lombare rettilinea, groppa larga e tendenzialmente quadrata; femmine: con caratteristiche simili a quelle descritte per i maschi meno accentuate, mammelle di forma globosa, di medio sviluppo e con capezzoli ben attaccati.

**Arti:** relativamente corti, fini ma non esili, in appiombato, esenti da tare, muscolosi nella coscia e nella natica con particolare attenzione nei maschi alla buona conformazione.

**Vello:** bianco con assenza di peli colorati, a lana fine (18-26 micron), serrato; ricopre completamente il tronco compresa la fascia ventrale ed il collo, può anche estendersi alle guance, ed alla fronte con faccia preferibilmente nuda; riveste gli arti anteriori almeno fino al terzo inferiore dell'avambraccio e gli arti posteriori fino al garretto.

**Pelle e pigmentazione:** sottile, rosea. Lingua, palato ed aperture naturali sprovviste di maculature di altro colore. Sono accettate: eventuale presenza di aree melaniniche.

I difetti tollerabili sono: vello scarsamente esteso, semichiuso o semiaperto, estensione del vello sulla faccia e sugli stinchi, presenza di pliche cutanee; presenza di peli morti nel vello dei maschi, presenza di pochi peli morti (giarra) nelle femmine; profilo arcuato nelle femmine e montonino nei maschi, presenza nelle femmine di lievi maculature nelle parti nude, cinghiatura del torace; arti troppo lunghi e con scarse masse muscolari; groppa stretta, allungata e spiovente, tronco a forma di cono.

I difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G. sono: vello pigmentato, presenza nei maschi di macchie nelle parti nude, ernia ombelicale, difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo), criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo. Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

## CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

Misure medie	18 mesi		Adulti	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	76	67	79	69
Altezza alla groppa (cm)	76	68	78	70
Altezza toracica (cm)	34	29	35	31
Larghezza media groppa (cm)	28	23	32	25
Lunghezza tronco (cm)	76	66	79	69
Circonferenza toracica (cm)	105	96	109	99
Peso(kg)	65	50	70	55

Fertilità annua: 93% per turno di accoppiamento.

Prolificità: 120-130%

Fecondità annua: 112-121% per turno di accoppiamento

L'età media al primo parto è di 14-18 mesi.

## ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Merinizzata Italiana è ad attitudine carne, ma produce anche lana di buona qualità.

La carne è principalmente ottenuta da agnelli leggeri, svezzati a 6-7 settimane di vita, con peso alla macellazione di 15-20 kg.

Peso medio dei soggetti in kg approssimati a 100 g						
SESSO	PARTO	ETA'				
		Nascita	45 gg.	90 gg.	6 mesi	1 anno
Maschi	Singolo	4,4	16,1	26,4	40,0	55,0
	Gemellare	3,6	15,5	26,0	40,0	55,0
Femmine	Singolo	3,8	14,0	22,0	35,0	45,0
	Gemellare	2,9	13,2	21,5	35,0	45,0

La produzione media di lana in sucido è di 4,5 kg negli arieti e di 2,5 kg nelle pecore. La lana è di buona qualità: diametro fibre 18-26 in micron.

Il latte prodotto è di buona qualità casearia infatti, è idoneo alla preparazione di formaggi tipici.