



RAZZA OVINA DELL'AMIATA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Dell'Amiata fa parte di una popolazione ovina stanziale conosciuta come Pecora dell'Amiata è la discendente diretta della cosiddetta «Pecora Comune Toscana», «Nostrale» o «Vissana» ampiamente presente nella Toscana Centrale o meridionale nella prima metà del XIX secolo. Successivamente questa popolazione ovina, a seguito di meticciamenti con pecore merinizzate, si suddivise in due ecotipi: il primo, diffuso nella zona delle Crete Senesi e del versante settentrionale del Monte Amiata chiamata semplicemente pecora Senese, di taglia maggiore ma meno produttiva; il secondo tipo, chiamata pecora dell'Amiata o Amiatina, di taglia più ridotta, fortemente merinizzata e più produttiva in tutte e tre le attitudini, si diffuse sul Monte Amiata ed in particolare sul Monte Labbro. Successivi scambi di riproduttori tra i due ecotipi portarono a ricostituire intorno alla metà del secolo scorso una popolazione relativamente omogenea chiamata Pecora dell'Amiata. La razza è oggi diffusa nell'area meridionale della Toscana tra le province di Grosseto e Siena, in particolare nei comuni di Arcidosso, Roccalbegna e Castell'Azzara e nella zona delle Crete Senesi compresa nei comuni di Asciano, Buonconvento, Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso e Trequanda. La sua area di diffusione coincide con quella di origine.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: media.

Testa: piccola, con profilo rettilineo o leggermente montonino. Orecchie relativamente corte e portate lateralmente. Presenza di corna nei maschi nel 62% degli arieti: un 13% presenta solo abbozzi cornei ed il restante 25% è acorne. Le femmine per l'89% sono acorni, il 7% è dotato di abbozzi ed il rimanente 4% è provvisto di corna.

Collo: di media lunghezza, relativamente sottile, bene attaccato.

Tronco: relativamente lungo e ben proporzionato, rettilineo.

Arti: solidi e relativamente lunghi.

Vello: bianco, semichiuso con bioccoli conici.

Pelle e pigmentazione: elastica e leggermente rosea.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G.:

- presenza di macchie scure della cute e del vello,
- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo),
- criptorchidismo anche monolaterale,
- ermafroditismo.

Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

Misure soggetti adulti	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	73,8	70,6
Altezza al sacro (cm)	74	70,6
Lunghezza tronco (cm)	79	70,6
Circonferenza toracica (cm)	100,4	96,9
Profondità del torace (cm)	35,1	32,9

L'indirizzo riproduttivo è verso la conservazione della variabilità genetica della razza pura, molto rustica e prolifica e allevata per la produzione della carne.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Dell'Amiata è una razza ad attitudine carne.

La produzione di latte media è di 75-90 kg con una resa in formaggio del 20% circa (legata alla trasformazione del cacio fiore e/o pecorino stagionato).

La produzione media di lana in sucido è di 2,4 kg negli arieti e di 1,2 kg nelle pecore.