

RAZZA OVINA ISTRIANA (CARSOLINA)



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Istriana (denominata anche Carsolina) deriva probabilmente da una popolazione autoctona dell'area carsica nord-adriatica, con influenze pugliesi e siriane di epoca romana, che nel diciassettesimo secolo è stata incrociata con ceppi ovini di provenienza balcanica. Pur non presentando una spiccata uniformità di caratteri, la razza rappresenta un gruppo etnico di notevole interesse. È diffusa su tutto l'altopiano carsico sia nella Venezia Giulia che in Slovenia e Croazia. In Friuli Venezia-Giulia sono presenti circa 300 soggetti in purezza nel territorio della Comunità montana del Carso. Un tempo le greggi venivano mantenute per nove mesi all'anno al pascolo nella zona del Carso, dove, fra novembre e maggio, utilizzavano i magri pascoli disponibili soprattutto della zona litoranea. Nel periodo estivo si ricorreva invece all'alpeggio. Oggi la pecora Istriana, si è adattata a un tipo di allevamento stanziale dove l'alimentazione viene integrata con minime quantità di fieno e concentrato.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: media.

Testa: proporzionata al corpo con profilo montonino e priva di lana. Orecchie medio-corte portate di lato mai pendenti. Corna a spirale aperta con frequente presenza di soggetti acorni nelle femmine.

Collo: di media forza e lunghezza e ben attaccato al tronco.

Tronco: allungato con torace tendenzialmente piatto, ma sufficientemente profondo e regione dorso-lombare rettilinea. Groppa di conformazione regolare con leggera inclinazione antero-posteriore. Coda lunga e sottile.

Arti: lunghi e sottili con articolazioni robuste e privi di lana. Gli unghiaelli di colore grigio, grigio-ardesia o neri.

Vello: grossolano a bioccoli aperti. Il colore è tendenzialmente bianco con frequente presenza di picchiettature e macchie nere o marroni. Si possono altresì riscontrare soggetti completamente neri o marroni.

Pelle e pigmentazione: sottile con pigmentazione che riprende quella tipica del vello.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G.:

- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo),
- criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo.

Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Giovani da 12 a 18 mesi	Adulti oltre 18 mesi
	Femmine	Femmine
Altezza media al garrese (cm)	68	73
Larghezza media groppa (cm)	20,2	22
Lunghezza media tronco (cm)	69,4	76
Circonferenza toracica (cm)	84	91

Nella gestione della riproduzione si lavora nel mantenere la variabilità genetica con la scelta di riproduttori non consanguinei anche sfruttando la natura transfrontaliera della razza. Esaltare le caratteristiche qualitative della produzione lattea funzionale alla trasformazione casearia in prodotti ad alto valore aggiunto senza perdere le caratteristiche doti di rusticità e frugalità.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Istriana è a duplice attitudine con prevalente indirizzo lattifero. La produzione media a lattazione è di circa 120-130 kg di latte.