

RAZZA OVINA MARRANA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Marrana viene denominata anche «Marrane» e il suo fenotipo suggerisce l'affinità con alcune razze da carne italiane: Bergamasca, Biellese e Appenninica, ancora attualmente presenti in numero significativo in Pianura Padana, Alpi e Appennino. Probabilmente la razza deriva da incroci con riproduttori di greggi locali. In passato questa razza veniva condotta al pascolo durante l'estate sui pascoli dell'Appennino ligure, Val d'Aveto e Rezoaglio (zone di allevamento e di probabile origine).

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: taglia e statura grandi, tipo da carne pesante.

Testa: grande, possente (di tipo bergamasco) con profilo tendenzialmente convesso, più accentuato nei maschi. Occhi grandi di colore scuro. Corna assenti. Orecchie grandi, pendenti di lunghezza superiore al muso e con estremità rivolta all'esterno.

Collo: tendenzialmente corto, abbastanza forte nelle femmine, molto forte nei maschi; ben impiantato sull'anteriore in entrambi i sessi.

Tronco: potente, tendenzialmente lungo; con garrese arrotondato e pieno, torace ben sviluppato e profondo. Lombi forti e abbastanza larghi, con groppa abbastanza lunga e larga ed un po' inclinata posteriormente. Il posteriore rispetto all'anteriore si presenta leggermente più alto. La coda nel maschio è lasciata integra ed è tendenzialmente corta, nelle femmine è tagliata.

Arti: arti e piedi forti, questi ultimi, presentano unghie bianchi serrati e molto robusti. Quelli anteriori sono più grandi dei posteriori.

Vello: vello bianco aperto, diritto di qualità "da materasso fine", esteso al tronco, al collo, alla coda, al torace ed alla testa sopra alla scatola cranica e per metà delle guance. Nei giovani i bioccoli sono aperti abbastanza arricciati. Sono sprovvisti di vello: l'addome, l'interno della coscia e gli arti.

Pelle e pigmentazione: cute bianca, abbastanza sottile ed elastica, con possibili pigmentazioni. Mucose esterne depigmentate; mucose interne, possono essere presenti pigmentazione colore ardesia più o meno estesa.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G.:

- presenza di corna,
- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo),
- criptorchidismo anche monolaterale,
- ermafroditismo,
- portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Adulti	
	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	87	85
Altezza alla groppa (cm)	90	87
Altezza toracica (cm)	48	42
Lunghezza tronco (cm)	105	89
Circonferenza toracica (cm)	125	114
Peso (kg)	80	70
Lunghezza groppa (cm)	26	33
Larghezza groppa – ilei (cm)	27	31
Larghezza groppa – ischi (cm)	17	20
Circonferenza stinco ant. (cm)	11	11
Circonferenza stinco post. (cm)	14	12
Lunghezza orecchio (cm)	28	25
Larghezza orecchio max (cm)	11	11
Occipite – punta naso (cm)	36	35
Attacco orecchie punta narice (cm)	31	29

Prolificità del 150% e 2 parti all’anno. Frequente il parto bigemino. L’età media al primo parto è di 13-14 mesi. Il peso degli agnelli alla nascita è di 4 kg.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Marrane, oggi ridotta allo stato di reliquia, era tradizionalmente allevata per la produzione di agnelli pesanti. Vista la ridotta consistenza l’obiettivo è la salvaguardia di questa razza dall’ estinzione.

Il latte viene totalmente poppato dagli agnelli fino a 2-3 mesi e la messa in asciutta è spontanea.

La produzione di lana sporca è di circa 3,5 kg nelle femmine e 5 kg nei maschi e viene utilizzata nella tradizione per filati a pelle.