

RAZZA OVINA NERA DI ARBUS



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Nera di Arbus è autoctona della Regione Sardegna. Gli allevamenti si trovano principalmente nel Medio Campidano (Arburese) e in Ogliastra, ma alcuni nuclei sono altresì presenti in altri paesi del bacino mediterraneo e in particolare nei paesi del nord Africa. Per le sue notevoli capacità di ambientamento, questa razza è presente nelle zone collinari e montane: ben si adatta al pascolamento nelle superfici cespugliate con macchia mediterranea.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: piccola.

Testa: distinta leggera, solitamente un po' allungata con profilo diritto o leggermente montonino nei maschi, faccia uniformemente nera con espressione vivace, occhi grandi e vivaci con leggero rigonfiamento palpebrale, narici larghe, bocca ampia, assenza di orecchie o padiglioni piccoli, corna presenti sia nei maschi che nelle femmine.

Collo: ben unito alle spalle ed al petto, lungo ed esile nelle femmine, più forte e più robusto nei maschi.

Tronco: allungato e di forma tronco-conica, garrese ben serrato, leggermente pronunciato e piuttosto affilato nella pecora, più muscoloso nell'ariete; torace profondo e leggermente piatto, spalle ben attaccate, leggere, giustamente inclinate ed in armonia con le regioni circostanti; dorso forte e diritto; linea superiore corretta; lombi larghi e robusti allineati con il dorso, ventre capace, arrotondato e ben modellato, fianchi pieni, larghi e profondi, groppa leggermente spiovente, più lunga che larga, coscia piatta, scarna e ben discesa. Coda esile e lunga. Mammella sferica, larga, ben sostenuta, forte negli attacchi, con tessitura morbida, spugnosa, elastica, quasi floscia dopo la mungitura, bene irrorata dalla corrente sanguigna periferica e con capezzoli proporzionati e ben diretti.

Vello: nero, aperto, costituito da bioccoli appuntiti, con presenza di peli morti nel sottovello, esteso fino a metà dell'avambraccio e poco sopra il garretto.

Pelle e pigmentazione: pelle sottile, elastica e di colore nero, talora con lieve picchiettatura bianca o marrone sulla testa, negli arti, e, in genere nelle parti prive di lana.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G.:

- lana merinizzata,
- vello bianco o marrone,
- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo),
- criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo.

Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

Misure medie	Adulti	
	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	65	58
Altezza alla groppa (cm)	28	24
Altezza toracica (cm)	20	18
Larghezza media groppa (cm)	63	60
Lunghezza tronco (cm)	80	73
Circonferenza toracica (cm)	46	35
Peso(kg)	65	58

Fertilità annua: (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle pecore partorite e il numero delle pecore matricine)è ancora da verificare.

Prolificità: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati e il numero delle pecore partorite) 120% in estate.

Fecondità annua: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati e il numero delle pecore matricine) 110% in estate.

L'età media al primo parto è di 15 mesi. È una razza a poliestro continuo con un breve intervallo di anaestro.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Nera di Arbus è a duplice attitudine: latte e lana.

Produzione media al netto del latte poppato dall'agnello nei primi 30 giorni.	Litri	Giorno
Primipare	50	100
Secondipare	88,2	180
Pluripare	98	180

Nel latte, la percentuale di grasso è di 6,5% e di proteine è di 5,6%.

Peso medio dei soggetti in kg approssimati a 100 g						
SESSO	PARTO	ETA'				
		Nascita	45 gg.	90 gg.	6 mesi	1 anno
Maschi	Singolo	3,2	9,8	17,0	30,3	40,0
Femmine	Singolo	3,0	9,5	16,0	24,9	28,0

La produzione media di lana in sucido è di 2 kg negli arieti e di 1,1 kg nelle pecore. La lana è di qualità grossolana, adatta per i materassi, tappeti e tessitura.