



RAZZA OVINA COMISANA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza ovina Comisana ha origini antiche che risalgono alla Sicilia dove questi ovini sono stati introdotti dal bacino del Mediterraneo. La Comisana deriva infatti dagli incroci degli ovini provenienti dal Mediterraneo (Paesi asiatico-africani) con quelli siciliani: per questo la Sicilia è la sua culla d'origine, e più precisamente il Comune di Comiso (RG), al quale deve il suo nome. La Comisana viene denominata anche «Faccia rossa» per la sua caratteristica testa color rosso-mattone con una lista bianca. È definita una razza a prevalente attitudine alla produzione di latte. Questa razza è diffusa prevalentemente in Sicilia, soprattutto nelle province di Caltanissetta, Enna e Palermo, ma gli allevamenti si sono estesi anche in altre province italiane, soprattutto nella parte meridionale e centrale della penisola. Nonostante sia una razza lattifera molto produttiva, è anche una pecora dotata di rusticità, capace di superare senza danni irreversibili periodi di carenza alimentare. L'ambiente di allevamento della zona di origine è caratterizzato da inverni miti ed estati siccitose. L'allevamento è di tipo stanziale-brado o semibrado, con integrazione di fieno in caso di necessità. Per le sue doti di eccellente produttrice di latte, ha avuto in passato diffusione in diverse altre parti del territorio nazionale, mostrando di adattarsi anche ad altre condizioni di allevamento, stabulazione fissa compresa.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: medio-grande.

Testa: fine, allungata, leggera, di colore rosso mattone (chiaro, spesso acceso) prevalentemente con striscia bianca che interessa normalmente la zona fronto-nasale e quella labiale superiore. Profilo retto o lievemente montonino. Acorne in ambedue i sessi. Priva di lana sia, nei maschi che nelle femmine o con leggero ciuffo nella zona della nuca.

Orecchie: di media lunghezza con portamento pendente o semi eretto.

Collo: sottile, medio - lungo, di norma scarsamente fornito di lana. Assenza di lana nella zona iugulo-sternale. Presenza o no di tettole in ambo i sessi.

Tronco: mediamente sviluppato con buoni diametri trasversi. Garrese poco sviluppato. regione dorso-lombare a profilo rettilineo. Groppa mediamente sviluppata sia in lunghezza che in larghezza, con accentuazione nei maschi. regione addominale ordinariamente priva di lana, sternale e interno delle cosce prive di lana.

Borsa scrotale: rivestita di fine lanugine. Entrambi i testicoli di appariscente sviluppo con solcatura mediana. Eventuale presenza di capezzoli in miniatura.

Mammella: consistente, con ampia base di attacco sin dall'epoca della pubertà. In fase di lattazione, prima della mungitura, voluminoso; fine e flessuosa dopo la mungitura. In asciutta molle e non pendente. Quarti raccordati da solco mediano non eccessivamente pronunciato. Capezzoli armonicamente sviluppati. Pelle fine ed untuosa, rete retro addominale venosa ricca ed appariscente. Eventuale presenza di capezzoli soprannumerari.

Arti: mediamente sviluppati, privi di lana; unghielli solidi.

Vello: bianco, aperto a bioccoli conici, con lana corta in tutta la zona caudale (presenza di peli morti nel sottovello).

Pelle e pigmentazione: elastica, sottile, di colore bianco roseo, zona caudale e genitale rosea.

Difetti tollerabili:

- presenza di maculature rosso mattone,
- astucci cornei,
- profilo montonino,
- orecchie con padiglione auricolare molto contenuto.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G.:

- presenza di corna in ambo i sessi,
- testa bianca,
- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo),
- criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo.

Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri letali a base ereditaria mendeliana certa.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

Misure soggetti adulti	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	70	80
Altezza alla groppa (cm)	65	75
Altezza toracica (cm)	40	45
Larghezza media groppa (cm)	25	30
Lunghezza tronco (cm)	75	85
Circonferenza toracica (cm)	95	105
Peso (kg)	60	80

Fertilità annua: (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle pecore partorite ed il numero delle pecore matricine): 95%.

Prolificità: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati ed il numero delle pecore partorite): 180%.

Fecondità annua: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati ed il numero delle pecore matricine): 171%.

L'età al primo parto è di 16 mesi.

Cicli estrali: razza poliestratale con limitati periodi di anaestro.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La Comisana è una razza ad attitudine latte.

Nella tabella sottostante, sono riportati i pesi medi dei soggetti in kg approssimati a 100 g:

Litri di latte produzione media esclusi i primi 30 giorni	Allevamento estensivo	Allevamento intensivo	Giorno	Lattazione convenzionale (giorni dal parto)
Primipare	70	100	100	130
Secondipare	100	170	200	210
Pluripare	120	200	200	210

Carne: peso medio dei soggetti in kg approssimati a 100 gr.

SESSO	PARTO	ETÀ				
		Nascita	45 gg.	90 gg.	6 mesi	1 anno
Maschi	Singolo	1	8,5	23	30	45
	Gemellare	3,3	8	20	25	42
Femmine	Singolo	3,5	7,5	18	24	38
	Gemellare	3	7,0	15	22	36

Nel latte, la percentuale media di grasso è del 6,5 % quella di proteine è del 5,2%.

La resa in formaggio fresco a 24 ore (esempio: tipo pecorino siciliano) è del 18-20%.

La resa in ricotta (aggiunta di latte fresco 10%) è del 10-12%.

La lana prodotta è di qualità grossolana; adatta per materassi.

Da una tosatura annuale la produzione in sucido è di 2,5 kg negli arieti e di 1,3 kg nelle pecore.

INDIRIZZO DI SELEZIONE

La selezione della razza ovina Comisana si propone di esaltare l'attitudine alla produzione di latte di buona qualità casearia e di incrementarne la produzione di agnelli puntando sull'aumento di prolificità, fertilità e longevità delle pecore.